



CALFODEX NEGRO

NÚMERO DE REGISTRO Q-7972-101

CALCIO Y MAGNESIO.

FORMULA:

Cada 100 ml contiene:

Calcio total (Carbonato de calcio e hipofosfito de calcio)	24.33 mg
Magnesio total (hidróxido de magnesio)	3.17 mg
Vehículo c.b.p.....	1 ml



INDICACIONES:

CALFODEX NEGRO se usa para la prevención y tratamiento de hipocalcemia después del parto en bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos, caninos y felinos en los ciclos de mayor producción láctea (fiebre de leche), acetonemia, hipomagnesemia, excesos de fósforo en la dieta en bovinos, ovinos caprinos, agotamiento por partos distóxicos, trastornos en el crecimiento por deficiencias de los componentes de la fórmula en bovinos, ovinos, caprinos, equinos, porcinos, caninos y felinos; tónico y reconstituyente e inotrópico positivo en falla cardiaca, renal e intoxicaciones en bovinos, equinos, caninos y felinos.

ESPECIES:

Bovinos (carne y leche), equinos (no destinados al consumo humano), ovinos, caprinos, porcinos, caninos y felinos.

DOSIS:

Bovinos: 500-1000 ml (12.165 - 24.33 g de calcio total y 1.585 - 3.17 g de magnesio total), equinos (no destinados al consumo humano), 250-500 ml (6.0825 - 12.165 g de calcio total y 0.7925 - 1.585 de magnesio total), ovinos y caprinos 30-125 ml (0.7299 - 3.04125 g de calcio total y 0.0951 - 0.39625 de magnesio total), porcinos 100 - 150 ml (2.433 - 3.6495 g de calcio total y 0.317 - 0.4755 de magnesio total), caninos 10 - 40 (0.2433 - 0.9732 g de calcio total y 0.0317 - 0.1268 de magnesio total), felinos: 5-15 ml (0.12165 - 0.36495 g de calcio total y 0.01585 - 0.04755 de magnesio total).

Se recomienda monitorear al animal durante 24 horas, y repetir cada 2 - 4 horas si es necesario.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Intravenosa lenta, intramuscular, subcutánea.

PRESENTACIÓN:

500 ml.



ADVERTENCIAS:

No administrar este producto en equinos para consumo humano.

Se puede inyectar por vía intramuscular o subcutánea hasta un máximo de 50 ml por punto de inyección en bovinos y de 20 ml en ovinos y porcinos.

De masaje en el sitio de inyección.

Mantenga en un lugar seco, fresco a no más de 30 °C y protegido de la luz solar directa.

No se deje al alcance de los niños, animales domésticos y personas discapacitadas.

Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.